

O QUE É RANIVISIO™?

- Ranivisio™ pertence a um grupo de tratamentos conhecidos por terapêuticas anti- VEGF-A (fator de crescimento endotelial vascular humano A).
- Ranivisio™ impede o VEGF-A (substância que pode afetar a visão) de causar mais lesões no olho, podendo até melhorar a visão já deteriorada.
- Ranivisio™ é utilizado em adultos para tratar várias doenças dos olhos que causam a perda de visão.

COMO É ADMINISTRADO O TRATAMENTO COM RANIVISIO™??

- Ranivisio™ é administrado por um médico oftalmologista, através de uma injeção no olho.

ANTES DO TRATAMENTO

Antes de lhe ser administrado Ranivisio™, deverá informar ao seu oftalmologista, caso tenha tido um acidente vascular cerebral ou tenha experimentado sinais passageiros de acidente vascular cerebral (como a fraqueza ou paralisia dos membros ou face, a dificuldade na fala ou dificuldades de compreensão) para que possa ser decidido se este é o tratamento mais adequado para você.

- É importante dizer ao seu médico:
 - Se há uma infecção ocular;
 - Se há alguma dor ou vermelhidão no olho;
 - Alergia a Ranivisio™ ou à solução de iodopovidona.
- O médico oftalmologista ou enfermeiro irão:
 - Cobrir a sua face e a área junto ao olho com um pano especial;
 - Utilizar um instrumento para manter o seu olho aberto;
 - Aplicar um anestésico local para prevenir qualquer dor.
- O médico oftalmologista irá, então, administrar a injeção na área branca do olho. Alguns pacientes sentem uma ligeira pressão no olho quando a injeção é administrada.

APÓS O TRATAMENTO

- O seu médico oftalmologista irá examinar o seu olho, incluindo a medição da pressão ocular, para assegurar que o tratamento correu bem.
- É provável que a área branca do olho, onde a injeção foi administrada, fique vermelha.
 - Esta vermelhidão é normal e desaparecerá ao fim de alguns dias;
 - Informe o seu oftalmologista se a vermelhidão não desaparecer ou se piorar.
- Poderá ver algumas manchas ou “moscas volantes” no seu campo visual.
 - Estas manchas são normais e desaparecerão ao fim de alguns dias;
 - Informe o seu oftalmologista se as manchas não desaparecerem ou se piorarem.
- A sua pupila será dilatada para a injeção, o que afetará a sua visão durante algumas horas após o tratamento.
 - Não dirija até que a sua visão regresse ao normal.
- É importante estar atento a todos os sintomas que possam surgir após o tratamento, quer em relação ao seu olho, quer a outros sintomas gerais na semana seguinte à injeção. Embora com pouca frequência, as injeções no olho podem causar infecções.
- Contacte imediatamente o seu oftalmologista se apresentar algum dos seguintes sinais ou sintomas: **dor no olho; aumento da sensibilidade/ lágrimas; pálpebras inchadas ou qualquer outro inchaço; aumento da vermelhidão; visão turva ou perda súbita de visão; flashes de luz; visualização de partículas, manchas pretas ou auréolas coloridas; ou sensação de “olho seco”.**

DURAÇÃO DO TRATAMENTO

- Cada paciente é único. A necessidade de continuar o tratamento com Ranivisio™ irá depender das alterações da sua visão.
- Fale com o seu oftalmologista acerca da sua evolução clínica, das suas preocupações sobre o tratamento e das diferentes opções de tratamento.
- É importante não faltar às consultas com o oftalmologista.



O seu médico irá monitorizar a evolução do seu olho e, dependendo de como responder ao tratamento, irá decidir se e quando necessitará de mais tratamentos.

Compareça a todas as consultas que o seu médico oftalmologista agendar para você.

COMUNICAÇÃO DE EFEITOS INDESEJÁVEIS:

Ao comunicar uma suspeita de reação adversa a este medicamento, certifique-se de que fornece o nome do produto e o número do lote do medicamento.

Pede-se aos pacientes que comuniquem quaisquer efeitos indesejáveis a BIOMM S/A através dos seguintes contatos:

Serviço de Atendimento ao Cliente pelo e-mail sac@biomm.com ou pelo telefone **0800-0572466**.